

**Docteur**  
**Paul MATTOU**  
Docteur ès Sciences Odontologiques

**Docteur**  
**Catherine MATTOU**  
Docteur ès Sciences Odontologiques

**Docteur**  
**Brice HOUVENAEGHEL**  
Docteur en Chirurgie Dentaire

**Docteur**  
**Cristina VAIDA**  
Docteur en Chirurgie Dentaire

X Y

Marseille, le 10/10/2016

1. Une brosse à dents INAVA 20/100<sup>e</sup>
2. Une brosse à dents INAVA chirurgicale 15 /100<sup>e</sup>
3. Fil EXPANDING + Fil IMPLANT ACCESS FLOSS GUM REF 3200
4. Révélateur de plaque bactérienne INAVA DENTO-PLAQUE
5. Miroir dentaire INAVA DENTO-GLASS
6. Brossettes interdentaires CRINEX Plus PHB ACL 4358313 Plus PHB ACL 4358276
7. Un flacon d'eau oxygénée 5 volumes
8. Dentifrice ARTHRODONT
9. ELUDRIL SOLUTION 90ml : 15ml à diluer, 3 fois par jour, pendant 8 jours 6 flacons

**Tous les soirs-----**

- ☒ Mettre 2 gouttes de révélateur sous la langue,  
puis passer la langue sur les faces de toutes vos dents
  - ☒ Préparer ELUDRIL : dilué dans un verre
  - ☒ Verser l'eau oxygénée (à 5 volumes) dans un verre
  - ☒ Tremper la brosse souple dans ELUDRIL
- Brosser les dents du bas puis du haut par groupe de 2 faces externes  
et internes par un mouvement de rouleau de la gencive vers la dent
- ☒ Nettoyage interdentaire :

- . Fil
- . Bâtonnet
- . Brossettes + eau oxygénée à 5 volumes

**Matin et Midi-----**

- ☒ Brossage soigneux avec le dentifrice ARTHRODONT

DR X